

Lítium szedést segítő oktató anyag

Hangulatzavarral járó betegségek kezelésére szolgáló gyógyszer.

A gyógyszer szedése mellett a napi 8-12 pohár víz ivása különösen javallott, amire a szervezetünknek szüksége van a kiegyensúlyozott működéshez is.

A folyadékfogyasztás a túladagolás elkerülése miatt is fontos, ennek tünete lehet a hányás, hasmenés, láz, ebben az esetben keresse fel a kezelőorvosát, és igyon sok folyadékot.

Mellékhatása lehet a kóros szomjúság, ami a szedés elkezdésének 1-2. napján alakulhat ki, azt követően nem valószínű. Beállítása ezért történik fokozatosan.

A kellemetlen tünetek elkerülése miatt kötelező időszakos labor vizsgálatokra fogja küldeni kezelőorvosa, és kérni fog egy EKG vizsgálatot.

Rendszeres labor vizsgálaton kontrollolok a lítium szint, vérkép, vércukor, elektrolitok, vese, pajzsmirigy ellenőrzése céljából szükségesek.

Laborvizsgálatra érkezése előtt vizet ihat, de ne vegye be a reggeli lítium tablettát, majd csak ha megtörtént a vizsgálat. Így lesz pontos a lelete.

A gyógyszer elhagyása fokozatosan történhet, a kezelőorvosával egyeztetetten.

Amennyiben elfelejtette bevenni, ne vegyen be duplán belőle.